

Divisiones et Plantæ Novæ Generis Hostæ (1)

auctore

Fumio MAEKAWA

前川文夫：ぎぼうし屬ノ分類（其一）

Hosta TRATTINICK (nom. conservanda)**Hosta** sect. **Bryocles** ENGLER, Pflanzenfam. II-5 : 39 (1889) emend.Syn. *Bryocles* SALISBURY in
Transact. Hort. Soc. I : 335 (1812)*Funkia* § *Bryocles* BAKER
in Journ. Linn. Soc. Bot. XI :
336 (1871) pro parte.*Hosta* § *Aleyone* BAILEY,
Gentes Herb. II-3 : 126 (1930)
pro parte.

Flores lilacini vel cærulei textu
tenuiores; pars tubi angusta alte
6-sulcata; pars inflata inter lobos
cum lineis translucentibus dis-
tincta. Antheræ sæpe cærules-
centes. Bractæe imbricatæ con-
cavo-naviculares virides.

Hosta sect. **Bryocles** subsect.
Eubryocles F. MAEKAWA sub-
sect. nov.

Syn. *Hosta* § *Bryocles* BAILEY,
Gentes Herbarum II-3 : 126 (1930).

Corolla : pars tubi inflata valde
ventricoso-campanulata intense
cærulea. Folia late ovata rigidiuscula. (Typus- *Hosta ventricosa* STEARN).




Fig. 1. *Hosta ventricosa* (× ca. 1/2)
むらさきぎぼうしノ花序ト葉、膨出セル
廣筒部ニ注意

Hosta sect. **Bryocles** Subsect. **Nipponosta** F. MAEKAWA subsect. nov.

Corolla ; pars tubi inflata infundibularis vel conica vel conico-campanulata ; purpurea a precedente dilutior. Folia angustata sæpe lineari-lanceolata herbacea. Scapus teres. (Typus-*Hosta lancifolia* ENGLER).

Hosta lancifolia ENGLER forma **Kabitan** F. MAEKAWA form. nov.

Syn. *Hosta japonica* var. *angustifolia* ASCHERSON et GRÆBNER f. *variegata* K. ÔNUMA in IWASAKI, Honzō-Zuhu XX : 4, fig. in fol. 18 (1916-1918).

Planta mediocris. Folia lanceolata vel oblongo-lanceolata 9-13 cm longa 3-4 cm lata undulata margine viridia medio sordide aureo-variegata raro albo-flavescente variegata.

Nom. Jap. *Kabitan-gibōsi* (ex IWASAKI)

Hab. Japonia, cult.

Hosta longissima HONDA in Bot. Mag. Tokyo, XLIX : 696 (1935) pro syn. *Hosta lancifolia* var. *longifolia*.

Syn. *Hosta japonica* var. *longifolia* HONDA in Bot. Mag. Tokyo, XLIV : 410 (1930).

Hosta lancifolia var. *longifolia* HONDA in Bot. Mag. Tokyo. XLIX : 696 (1935).

Hosta longissima var. **brevifolia** F. MAEKAWA var. nov.

Syn. *Hosta japonica* var. *angustifolia* ASCHERSON et GRÆBNER sic MAKINO in IINUMA's Somoku Dzusetsu ed. 3. II : 466, t. 353 (1910).

Hosta lancifolia var. *angustifolia* KOIDZUMI in Acta Phytotax. Geobot. V : 38 (1936) excl. syn.

Planta gracilis paludicola. Folia recto-patentia lineari-oblancoolata apice obtusiuscula basi ad basin sensim angustata 17.5-19 cm longa 1.7-2.1 cm lata utrinque planissima nitida griseo-viridia. Racemi oliganthi 3-5-flori. Bractea 8-9 mm longæ acutissimæ. Flores parvi horizontales.

Corolla dilute roseo-purpurea 3 cm longa 1.3-1.5 cm lata. Pars tubi angusta albescens 6-sulcata ca. 13 mm longa ad apicem sensim inflata ; pars inflata 10 mm longa 11 mm lata conico-infundibularis. Lobi erecti 12 mm longi ; exteriores oblongo-lanceolati acutissimi ; interiores ovato-elliptici

late acuti. Stamina sub anthesin corollæ æqualta. Antheræ cæruleæ 1.5 mm longæ ellipticæ. Pistillum staminibus æquilongum.

Nom. Jap. *Mizu-gibōsi* (ex IINUMA), *Sazi-gibōsi* (ex IINUMA).

Hab. Japonia, Honsyū : prov. Aki, Gōbara (F. MAEKAWA-Typus), prov. Settu, Mt. Rokkō (Y. HIRAO), prov. Mikawa, ad peninsulam Atumi (fide Y. OKAMI).

Hosta opipara F. MAEKAWA, sp. nov.

Ab *H. rectifolia*, foliis horizontale patentibus differt. Folia ex basi horizontale patentia ampla planata elliptica vel ovato-elliptica paulum undulata acuminata basi contracta 13.5–18 cm longa 7–12 cm lata utrinque 9-nervia, late albido-vel luteo-marginata. Petioli 11–14 cm longi. Scapus erecti 80 cm alti. Bracteæ late ovatæ vel ovato-ellipticæ 9–15 mm longæ acutæ. Flores horizontales. Corolla 40–42 mm longa 25–29 mm lata subcampanulato-infundibularis lilacina. Pars tubi angusta 12 mm longa ; pars inflata 14 mm longa 17 mm lata, lineis translucetibus paulum impressis. Lobi patentiusculi 19 mm longi quam pars inflata longiores, exteriores oblongi acuti 8 mm lati, pars interiores elliptici obtusiusculi albo-marginati basi cuneato-angustati 10–11 mm lati. Stamina 35 mm longa corollam breviora crassa. Antheræ 3.2 mm longæ margine cæruleæ. Pistillum 47 mm longum.

Nom. Jap. *Nisiki-gibōsi* (nom. nov.)

Hab. Honsyū, prov. Mutu, Hirosaki, cult. (A. KIKUTI-Typus)

Hosta helonioides F. MAEKAWA, sp. nov.

Folia diffusa lineari-ob lanceolata attenuata basi ad petiolum sensim angustata, cum petiolo 17–18 cm longa 1.7–2.5 cm lata sæpe margine undulata utrinque 3–4-nervia opaca viridissima. Scapi erecti basi purpureo-punctati, sub bracteas florentes bracteas vacuas oblongo-lanceolatas naviculares convolutas superne incurvatas distantes numerosas instructi. Bracteæ fertiles naviculare convolutæ 17–32 mm longæ oblongo-lanceolatæ acuminatæ virides sub anthesin persistentes. Pedicelli 5–10 mm longi. Flores dilute purpureo-striati subdeclinati 5 cm longi 3 cm lati. Pars tubi angusta 17 mm longa, pars inflata edem æquilonga lineis translucetibus paulum impressis. Lobi recto-

patentes vel patente recurvati parti inflatæ æquilongi, exteriores oblongo-lanceolati, interiores ovato-lanceolati. Stamina corolla breviora 5 cm longa.



Fig. 2. *Hosta helonioides* f. *albo-picta*
ふくりんはかまぎぼうしノ開花 (京都植物園)
Antheræ cæruleæ 3.2 mm longæ ellipticæ.
Pistillum 5.4 cm longum.

Nom. Jap. *Hakama-gibōsi* (nom. nov.)

Hab. Japonia, Honsyū: prov. Uzen (A.

KIKUTI, no. 192-Typus)

***Hosta helonioides* forma *albo-picta* F. MAEKAWA, form. nov.**

Folia albo-marginata.

Nom. Jap. *Hukurin-hakamagibōsi* (nom. nov.)

Hab. Japonia; Honsyū: prov. Uzen (A. KIKUTI, no. 155, 156 et 190).




Fig. 3. *H. rhodeifolia* (the left scape and the lower flower) and *H. helonioides* (the central & right scapes and the upper flower)

おもとぎぼうしノ花莖 (左) ト花
(下) はかまぎぼうしノ花莖 (中、
右) ト花 (上) 花莖上ノ苞葉及
花ノ形状ノ差異ヲ示ス。

Hosta rhodeifolia F. MAEKAWA, sp. nov.

Folia recta 25–40 cm alta lamina superne patentiuscula, petiolo 13–25 cm longo margine flavido-striato; lamina lanceolata vel oblongo-lanceolata viridissima luciduscula margine planata subconvoluta flavido-marginata basi angustata utrinque 5–6-nervia. Scapus folia alte superans 75–120 cm longus erectus medio bracteas vacuas viridissimas sæpe albido-marginatas 3–9 cm longas amplexicaules 5–6-vestitus. Bracteæ fertiles ovatae valde naviculares albo-flavescente marginatae convolutae obtusiusculæ basi amplexcentes 1.5–3 cm longæ post anthesin persistentes. Flores sublaxi ex basi abrupte nutantes. Pedicelli breves.

Corolla 45 mm longa 36–41 mm lata, “Pale Hortense Violet”, nervis purpureis. Pars tubi angusta 15–16 mm longa 2.8–3.5 mm lata albescens; pars inflata subito campanulato-infundibularis lineis translucetibus subimpres-sis, 15–16 mm longa 22–24 mm lata. Lobi erecto-patentes; exteriores oblongo-lanceolati acuti ca. 20 mm longi, interiores ovato-oblongi obtusi. Stamina corolla breviora 42 mm longa. Antheræ oblongæ 3 mm longæ.

Nom. Jap. *Omoto-gibōsi* (nom. nov.)

Hab. Japonia, occidentalis, cult.

Hosta sect. **Bryocles** subsect. **Lamellatæ** F. MAEKAWA, subsect. nov.

Scapus lamellato-striatus. Folia in sicco pergamentacea. (Typus-*Hosta venusta* F. MAEKAWA).

Hosta venusta var. **decurrens** F. MAEKAWA, var. nov.

Folia oblongo-ovalia subacuminata basi cuspidato-angustata margine planissima utrinque 4-nervia 36–40 mm longa 14–16.5 mm lata.

Nom. Jap. *Mame-gibōsi* (nom. nov.)

Hab. Japonia; Tyōsen: Insula Saisyūtō, monte 1500 m (T. ISIDOYA, no. 32-Typus).

Hosta Nakaiana F. MAEKAWA in Journ. Jap. Bot. XI: 687 (1935).

Hab. Japonia, Kyūsyū: prov. Hizen, Mt. Taradake (F.C. GREATREX), Mt. Unzen (fide T. HUZII), Honsyū: prov. Settu, Mt. Rokkō (A. KIMURA)

Nova ad floram Japoniæ Propriæ.

Hosta minor NAKAI in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo, XXXI : 251 (1911) (excl. syn. *H. longipes*), Report Pl. Isl. Quelpært : 31 (1914), Report Veg. Diamond Mts : 167 (1918)-MORI, Enum. Corean Pl. : 89 (1922)-BAILEY, Gentes Herbarum II-3 : 142 f. 79 (1930).

Syn. *Funkia ovata* var. *minor* BAKER in Journ. Linn. Soc. XI : 368 (1871)

Folia paulum undulata late ovata vel ovato-orbiculata basi breviter cordata sæpe truncata. Scapus folia alte superans striato-lamellatus. Flores 4.5-5 cm longi : tubi pars inflata campanulato-infundibularis.

Nom. Jap. *Keirin-gibōsi* (nom. nov.) *Ko-gibōsi* (T. NAKAI, 1914 non T. MAKINO, 1910).

Hab. Japonia, Tyōsen : Insula Saisyūtō (T. MORI), prov. Kōgen, Mt. Kongōsan (T. UCHIYAMA), ibid. (T. NAKAI).

Hosta sect. **Bryocles** subsect. **Tardanthæ** F. MAEKAWA, subsect. nov.

Scapus teres rigidus. Flores serotini ; pars tubi inflata sæpe ampla intus absque lineis translucetibus homogene purpureo-tincta. (Typus-*Hosta tardiva* NAKAI).



Fig. 4. *Hosta tardiva* なんかいぎぼうしノ開花ヲ背後ヨリ見ル

Hosta clausa NAKAI var. **normalis** F. MAEKAWA, var. nov.

Syn. "*Hosta cærulea* TRATTINICK" NAKAI in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo, XXXI : 251 (1911).

Hosta japonica var. *lancifolia* NAKAI, Report Veg. Diamond Mts : 167 (1918).

"*Funkia lancifolia* SPRENGEL" F. CZERNIAKOVSKA in KOMAROV, Fl. URSS, IV : 55, t. 5 f. 2 (1935).

Rhizoma hypogeum longissimum apice innovationem sympodia! surgit. Folia erecta longe petiolata ; petiolo 13-22 cm longo ; lamina ovato-elliptica vel elliptica planata non vel paulum undulata 11.5-13.5 cm longa 5-8 cm lata cuspidata basi acuta contracta textu rigescentia nervis utrinque 6-7. Scapus folia superans 65-76 cm altus rigidus teres inferne atro-purpureo-coloratus medio 1-2-bracteatus. Racemus rectus spiciformis. Bracteæ ovatæ acutissimæ 7-10 mm longæ sub anthesin persistentes. Pedicelli erecto-patentes eum bractea æquilongi. Flores cæruleo-purpurei (?) 5 cm longi 2-



Fig. 5. *Hosta clausa* つぼみぎぼうしノ花盛り、コノ状態ノ儘デ開カズ凋落スル、中井教授栽培ノモノヲ撮ス

2.5 cm lati. Pars tubi angusta 18-20 mm longa ; pars inflata infundibularis 18 mm longa 15-18 mm lata. Lobi recto-patentes ovati acutissimi 11 mm longi 8 mm lati. Stamina corollæ æquilonga. Pistillum stamina superans 58 mm longum.

Nom. Jap. *Sakuhana-gibōsi* (nom. nov.)

Hab. Japonia, Tyōsen, prov. Kōgen, Mt. Kongō (T. NAKAI, no. 5255-Typus), ibid. (T. UCHIYAMA), ibid. (M. KOBAYASI), prov. Hei-hoku, Senzan (H. IMAI, no. 7).

Hosta ensata F. MAEKAWA, sp. nov.

Syn. "*Funkia lancifolia* SPRENGEL" KOMAROV, Fl. Mansh. I: 441 (1901).

"*Hosta lancifolia* ENGLER" NAKAI in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo XXXI: 250 (1911).

Hosta japonica var. *lancifolia* NAKAI apud MORI, Enum. Korean Pl 89 (1922).

Hosta clausa var. *ensata* F. MAEKAWA schedl. in Herb.

Rhizoma hypogæum longissimum. Folia erecto-patentia, petiolo brevi 2.5-6 cm longo sæpe late alato dorso sordide punctato, lanceolata vel oblongo-lanceolata attenuata basi ad petiolum sensim decurrentia 7.5-11.5 cm longa 1.5-2.8 cm lata textu rigida planata nervis utrinque 4-5-nervia. Scapus folia alte superans 30-60 cm longus rigidus inferne punctatus. Bracteæ 9-10 mm longæ ovato-oblongæ acutæ naviculares sub anthesin haud persistentes. Pedicelli erecti bracteæ subæquilongi, floribus horizontalibus. Corolla cæruleo-atro-purpurea (?) 4.5-5 cm longa. Pars tubi angusta 18 mm longa; pars inflata subito dilatata late infundibularis lineis translucentibus distinctis, 15 mm longa 18 mm lata. Lobi erecto-patentiusculi, exteriores ovato-lanceolati acuti 12 mm longi 8 mm lati, interiores ovati basi obtusi 10 mm lati. Stamina corollæ subæqualia. Pistillum stamina superans.

Nom. Jap. *Turigi-gibōsi* (nom. nov.)

Hab. Japonia, Tyōsen: prov. Kōgen: inter Tyosen et Kōzyō (T. NAKAI, no. 5253-Typus), prov. Keiki, Keizyō, Hokkanzan (T. UCHIYAMA), Nanzan (T. UCHIYAMA), prov. Kan-nan, Daikōri, (T. NAKAI, no. 3498). Manchukuo: Flumen Jalu-dsian prov. Mukdensis (V. KOMAROV, no. 366).

Hosta sect. **Picnolepis** F. MAEKAWA, sect. nov.

Planta saxatilis. Folia rigescentia. Bracteæ imbricatæ sed textu tenues albo-roseo-tinctæ. Flores serotini. Corolla textu tenuis: pars tubi angusta angulata vel teres nunquam sulcata. (Typus-*Hosta longipes* BAILEY)




Fig. 6. *Hosta longipes*
いはぎぼうしノ花序




Fig. 7. *Hosta Fortunei* おほばぎ
ぼうしノ苞葉ヲ上ヨリ見ル

Hosta sect. Foliosæ F. MAEKAWA
sect. nov.

Scapus foliosus. Bracteæ imbricatæ viridissimæ valde naviculares. Corolla lilacina : pars tubi angusta obtuso-angulata. (Typus-*Hosta undulata* BAILEY)

Hosta sect. Helipteroides F. MAEKAWA, sect. nov.

Folia ampla multinervia. Bracteæ patentissimæ albescentes. Corolla lilacina vel alba textu carnea : pars tubi angusta angulata. (Typus-*Hosta Fortunei* BAILEY).

Hosta nigrescens (MAKINO) F. MAEKAWA, sp. nov.

Syn. *Hosta Sieboldiana* var. *nigrescens* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo, XVI: 173 (1902) in IINUMA's Sōmoku Dzusetsu, ed. 3, II : 469, pl. VI-27 (1910).

Folia erecta vel erecto-patentia fortia, petiolo 40 cm longo glauco crasso rigido, ovata obtusa apice tantum cuspidata basi cordata atque convoluta, ita ut infundibulare esse videntur, 22-29.5 cm longa 13-21 cm lata valde coriacea planissima lævissima primo utrinque intense glauca mox nitidula

lutescente atro-viridia, nervis utrinque 12-13. Scapus crassus teretissimus erectus superne arcuatus 75-110 cm longus glaucus. Bractea patentēs ovato-lanceolatae albo-viridescētes purpureo-marginatae 2-3 cm longae. Flores albi vel dilutissime lilacino-suffusi 5 cm longi.

Nom. Jap. *Kuro-gibōsi* (ex INUMA).

Hab. Japonia in hortis collitur.



Fig. 8. *Hosta nigrescens* くろぎぼうしノ結實
(遠州秋葉山三尺坊ニテ寫ス)

***Hosta Kikutii* F. MAEKAWA, sp. nov.**

Folia ampla elliptica vel elliptico-ovata vel ovato-lanceolata 15-20 cm longa 7.5-14 cm lata planata vel undulata acuminata vel cuspidata basi anguste decurrentia vel cordata vel truncata viridissima utrinque 8-10-nervia. Petiolus lamina brevior late alatus. Scapus folia alte superans rigidus supra medium bracteatus, bracteis vacuis saepe foliaceis. Flores densissime racemosi albi serotini. Bracteae albescentes lanceolatae 15-20 mm longae sub anthesin emaridæ. Pedicelli erecto-patentes bracteam superantes 25 mm longi. Corolla 45 mm longa 28 mm lata carnosa : pars tubi angusta 17 mm longa subangulata ; pars inflata subcampanulato-infundibularis 18 mm longa 20 mm lata. Lobi erecto-patentes ovato-deltoides 13 mm longi, exteriores 8.5 mm lati, interiores




Fig. 9. *Hosta Kikutii* ひうがぎぼうしノ若キ花序アル個體 (藤井利重氏寫眞)

10-15 mm lati acutissimi. Stamina corollæ æquilonga.

Nom. Jap. *Hyūga-gibōsi* (KIKUTI, nom. nov.)

Hab. Japonia, Kyūsyū; prov. Hyūga, Mt. Sōsekizan (B. MIYAZAWA-Typus), prope Ins. Aosima (M. TōYAMA); Sikoku: prov. Tosa, Mt. Yokogura (M. URAKAWA et T. HUZII).

Professori A. KIKUTI Universitatis Imperialis Kyotensis, qui per diuturnum innumerabiles collectiones Hostæ generis labore confecit, quasque investigare mihi benevole reddidit hanc speciem dedixi.

ぎぼうしノ類ハ今日迄古クハ SALISBURY, BAKER, SIEBOLD, MIQUEL, 近クハ中井、小泉兩先生ヲ始メ NASH, L. H. BAILEY, STEARN ノ諸氏ノ研究ガアルガ、猶解明シツクサレヌ處ガアリ、名稱ハ混淆シテ氣ニカ、ツテ居タ屬ノ一ツデアツタ。ソレデ三四年來心懸ケテ材料ヲ蒐メテ觀察シテ居タ處、京都帝國大學農學部園藝學教室ノ菊池秋雄教授ガ廣ク各地カラ豊富ニ蒐集サレテコレノ分類學的研究ヲ中井教授ニ依囑セラレタノヲ兩先生ノ御許シヲ得テ私が研究サセテ頂クコト、ナリ實ニ多クノ知見ヲ新タニスルコトガ出來タ。又一方デハ新宿御苑ニ居ラレル岡見義男氏、小石川植物園ノ松崎直枝氏ソノ他ノ方々カラ多數ノ材料ヲ供給サレ、大體ノ見當ガツイタノデコ、ニソノ一部ヲ發表シタイ

ト思フ。コ、ニ改メテ中井、菊池兩教授ニ厚ク感謝スルト共ニソノ他ノ方々ノ御好意ニ謝スル次第デアル。

Hosta sect. Bryocles ENGLER (修正) みづぎぼうし節 花冠ハ紫色、又淡紫色、質薄ク草質デ細筒部ニ6縦溝アリ。廣筒部ニハ透明線縦走シテ明カナリ。苞ハ舟狀ヲナシテ鱗次ス、即チ擬寶珠ノ名ノ來タル所デアラウ。コレヲ次ノ **subsect.** ニ分ツ。

Subsect. Eubryocles F. MAEKAWA むらさきぎぼうし亞節 第1圖ノ如ク花冠廣筒部ハ急ニ膨ラミ洋盃狀ヲナス。色ハ濃紫。支那ニ自生スル *Hosta ventricosa* STEARN 唯一種アリ、日本デハ稀ニ栽培ヲ見ルモノデむらさきぎぼうし(菊池)トイフ。*Hosta caerulea* TRATTINICK ノ正體ハコレデアル。

Subsect. Nipponosta F. MAEKAWA みづぎぼうし亞節 廣筒部ハ漏斗形或ハ稍々鐘形ヲ帶ブ。前者ヨリ淡色、こばぎぼうし(*Hosta lancifolia* ENGLER)ノ一群ガ屬スル。こばぎぼうしノ葉ニ黃白斑アルモノヲかびたんぎぼうし(本草圖譜)トイフ。關西以西ニアルほそばみづぎぼうしトイハレタモノハ草木圖説ニ明ラカナみづぎぼうしデアツテ所謂みづぎぼうし即チこばぎぼうしトハ光澤著シイ線狀倒披針形ノ葉ヲ生ジ、花ハ疎且少、又小形デ長サ 3cm ニ過ギナイノデ別種デアル。本田博士ノながばみづぎぼうしハコレノ長葉品デアルカラ、ソノ別名 *Hosta longissima* HONDA ヲ採用シコレノ普通品ハ **var. brevifolia** F. MAEKAWA トスル。

弘前地方デ稀ニ栽培スル種ニたちぎぼうしノ如キ花ヲ開キ、葉ハ廣潤デ根元ヨリ平開スルモノガアル。菊池教授ノ採集ニカ、リ黃白色ノ覆輪デ美シイノデにしぎぎぼうしトシタ。

山形縣下ニ葉形及ソノ叢出恰モしやうじやうばかまノ觀ヲ與ヘルこばぎぼうしノ一種ガアル。亦菊池教授ノ蒐集ニカ、ル。花莖ノ中邊ニハソレトハ離レテ捲込シタ數個ノ莖上葉ヲ着ケルノデ著シイ。花ハ細長イ。コレヲはかまぎぼうしトシタ。

關西以西デ屢々栽培スル一品ニ新タニおもとぎぼうしト名付ケタノガアル。葉ハ何レモ立チ長橢圓狀披針形ノ葉ハ暗綠色ヲ呈スル。花莖花冠トモニたちぎぼうしニ類スルガ色遙カニ淡ク淡紅紫色デ花梗ノ附根カラ強ク下向シ、又花莖ノ中邊ニ固クソレヲ卷イタ莖上葉數個ヲツケル。

Subsect. Lamellatae F. MAEKAWA をとめぎぼうし亞節 花莖ニ縱稜線ヲ有スル特異ノ一群デアル。をとめぎぼうし、かんざしぎぼうしガコレニ屬スル。前者ノ葉身多少流レルモノヲ濟州島ノ標本デ知ツタ。後者ハ肥前多良岳ヤ溫泉岳、攝津六甲山ニモアル。*Hosta minor* (BAKER) NAKAI ヲ最も早ク區別サレタノハ中井教授デアルガ、本種ハ鮮南群島ヤ金剛山ニ産シ葉底截形乃至心形ヲナスノデ著シイ。和名ハ古イ同名ヲ避ケテけいりんぎぼうしトシタ。

Subsect. Tardanthæ F. MAEKAWA なんかいぎぼうし亞節 花期ハ晩ク秋ニ入り、花ハ廣筒部廣キ漏斗狀ヲナシ暗紫色ヲ呈ス。中ニ花ガ正開シナイつぼみぎぼうし *Hosta*

clausa NAKAI ガ朝鮮ニアルガ、コレニ似テ正開スル花ヲ出スモノモアル。後者ヲ *var. normalis* F.M. つぼみニ對シテさくはなぎぼうしトシタ。又同ジク朝鮮ニ廣ク本種ニ似テ、葉短ク黒綠色強韌ノ劍形ヲ呈スル種ヲつるぎぼうしトシテ分ケタ。

Sect. **Picnolepis** F. MAEKAWA いはぎぼうし節 主トシテ岩上ニ生ジ、葉ハ強剛、開花遅ク、苞ハ薄膜質舟形デ重ナリ美シイ。花冠ハ細筒部ハ圓柱形或ハ稍々鈍稜アリ。

Sect. **Foliosæ** F. MAEKAWA すぢぎぼうし節 苞ハ綠色ノ舟形デ密ニ重襲スルガ、花冠ハ多肉、細筒部ニハ溝ヲ生ジナイ、花莖ニハ極メテ屢々顯著ニ葉ヲツケル。

Sect. **Helipteroides** F. MAEKAWA おほばぎぼうし節 苞ハ多數集合シ平開シ、シカモ大抵白化セルタメ上ヨリ見レバ圖ノ如ク星芒狀或ハ太陽ノ觀ヲ呈スル。おほばぎぼうしヲ中心トスル大形ノ一群デアル。コノ内くろぎぼうしハ葉ニ特異ノ白霜アルコト、厚味アリ全ク平滑、基脚ハ顯著ニ捲クコト等デ種ニ引上ゲタ。ひうがぎぼうしハ菊池教授ノ命名デ、甚ダ變ツタぎぼうしデアル。葉ハ多形デアルガ色淡ク脈ノ走向ニ一種ノ特徴ガアル。花莖ハ屢々猛烈ニ葉ヲ伴ヒ、白質花ハ密集シタ總狀ヲナシテ秋日ニ開ク、日向デ發見サレ、土佐ノ山地デモ見出サレタ。

(續ク)

~~~~~

Ileodictyon 屬ハ *Clathrus* 屬ニ包含 スルヲ可トス

籠茸ノ屬ハ *Clathrus* トスルヲ妥當トシ *Ileodictyon* トスルハ非ナリ

川 村 清 一

S. KAWAMURA: The genus *Ileodictyon* ought to be included in
the genus *Clathrus*.

かごたけ及近邇ノ一種ノ菌ノ分類上ノ所屬ニ就テハ、現今一般ニあかかごたけ [*Clathrus cancellatus* (TOURN.) FR.] ト同屬トシテ夫々 *Clathrus gracilis* (BERK.) SCHLECHT., *Clathrus cibarius* (TUL.) SCHLECHT. ナル學名ガ用キラレテ居ル。併シ昔 TULASNE ガ此後者ニ初メテ學名ヲ與ヘタ際ニハ、あかかごたけヲ基本トスル *Clathrus* 屬ノモノトスルニハ、屬トシテ性質ニ異ル所ガアルトテ、特ニ新屬ヲ設ケテ *Ileodictyon cibarium* TUL. ナル學名ヲ與ヘタ。又其翌年ニ BERKELEY ガかごたけニ初メテ學名ヲ與ヘタ際ニモ、其同屬異種トシテ *Ileodictyon gracile* BERK. ト命ジタ。然ルニ後ニ至ツテ SCHLECHTENDAL ハ是